# ORNITOLOGIA

## NOTAS SOBRE AVES DE COLOMBIA, IV (*)

POR EL HERMANO NICÉFORO MARÍA,

Director del Museo de Historia Natural del Instituto de "La Salle", Bogotá.

### ARDEIDAE

**Bubulcus ibis ibis** (Linnaeus)

*Ardea ibis* Linnaeus, Syst. Nat., ed 10, vol. 1, p. 144, 1758 (Egipto).

Por circunstancias especiales, desde la fecha infausta de la destrucción del Museo del Instituto de La Salle, Bogotá, el 10 de abril de 1948, nada he publicado que tenga relación con las nuevas colecciones de este Museo.

El 20 de marzo de 1949, dos años antes de conocerse los primeros datos sobre la presencia de la garza *Bubulcus ibis ibis* (Linn.) en Colombia (**) el R. H. Filiberto Javier, Rector del Instituto Técnico Central, Bogotá, cazó una hembra de esta especie en los arrozales de San Luis, cerca de Cúcuta, Norte de Santander, a pocos kilómetros de distancia de la frontera venezolana y a unos 200 metros de altitud sobre el nivel del mar.

---

(*) Las tres primeras partes de esta serie fueron publicadas como sigue:
I Caldasia 3, Nº 14, pp. 367-395, 20 Sept. 1945.
II Caldasia 3, Nº 19, pp. 317-377, 30 Mayo 1947.
III Caldasia 3, Nº 21, pp. 201-210, 20 Marzo 1948.

(**) Acerca de los diversos hallazgos de *Bubulcus ibis ibis* en Colombia véase: A. WETMORE, Smiths. Misc. Coll. 117, Nº 2, p. 1, 25 Sept. 1951; J. I. BORRERO, Lozania (Acta Zool. Col.) 1, p. 8, 22 Mayo 1952; R. M. DE SCHAUENSEE, Caldasia 5, Nº 26, p. 1144, 1º Julio 1952; A. DUGAND, Lozania (Acta Zool. Col.) 8, pp. 1-7, 23 Enero 1954; Caldasia 7, Nº 31, pp. 83-87, 3 Mayo 1955.

NOTA. En la importante colección de pieles de aves exóticas del Museo de La Salle que fueron devoradas por el incendio, figuraban tres ejemplares adultos de *Bubulcus ibis ibis*, en hermoso plumaje "nupcial"; habían sido coleccionados en Egipto, en 1902.

El ejemplar tiene el plumaje blanco, con señales de asalmonado claro en la coronilla y la nuca; el pico es enteramente amarillo.

*Dimensiones.*— Culmen (parte expuesta), 56; ala (aplanada), 235; cola, 86; tarso, 71 mm.

## BUCCONIDAE

### **Hypnelus bicinctus bicinctus** Gould

*Tamatia bicincta* Gould, Proc. Zool. Soc. Lond., 1836, p. 80 ("Cayenne" = Venezuela).

COLOMBIA.— Meta: 19 kms. al oriente de Villavicencio, Hacienda "Tanané", alt. 460 metros, 7 Mayo 1953, 1 ♂ adulto; colector H. Nicéforo María.

Este ejemplar, con plumaje muy gastado, fue cobrado a la orilla de una laguna desbordada.

Dimensiones.— Ala, 90; cola, 84; tarso, 19; culmen desde la base 36; culmen (parte descubierta), 32 mm.

El señor William H. Phelps cotejó muy gentilmente esta piel con una serie numerosa de *bicinctus* de Venezuela, en su colección particular, y tuvo a bien informarme (*in litt.* Dic. 29, 1954) que en dicha colección figuran ejemplares procedentes de la región fronteriza colombo-venezolana: Puerto Ayacucho, Alto Orinoco, y Guasdualito, sobre el Río Apure. Puerto Ayacucho dista unos 650 kilómetros al este de Villavicencio, y Guasdualito unos 460 kilómetros al nordeste. El hallazgo de *Hypnelus b. bicinctus* cerca de Villavicencio, y al pie de la Cordillera Oriental, extiende considerablemente el área de su distribución geográfica hacia el occidente y constituye el segundo registro de esta subespecie para Colombia (*).

## THRAUPIDAE

### **Anisognathus lacrymosus tamae** Phelps y Gilliard

Amer. Mus. Novit. Nº 1153, p. 12, Nov. 26, 1941 (Páramo de Tamá, Táchira, Venezuela).

---

(*) El primero, también de la base oriental de los Andes Orientales, en Casanare, lo publicó recientemente M. A. Carriker Jr. en *Novedades Colombianas* (Contr. Cientif. Mus. Hist. Nat. Univ. Cauca, 2, p. 54. 1955).

COLOMBIA.— Norte de Santander: Páramo de Fontibón (*). 4 ♂, 1 ♀, 26 Mayo - 15 Julio 1949.

Se publica por primera vez el hallazgo de esta tráupida en territorio colombiano. Los registros de *Anisognathus lacrymosus tamae* a alturas entre 2700 y 2800 metros, en el Páramo de Fontibón, extienden el área de esta subespecie desde el lado venezolano del Páramo de Tamá hasta algunos kilómetros al sur y sureste de Pamplona, Norte de Santander, Colombia.

Tres de los ejemplares fueron coleccionados por el R. H. Filiberto Javier, a quien doy mis muy cordiales agradecimientos por su cooperación en la formación de las nuevas colecciones del Museo de Historia Natural de "La Salle", en Bogotá.

---

(*) El Páramo de Fontibón se halla al sur de Pamplona, separa la hoya del Río Pamplonita, afluente del Zulia (que desemboca en el Lago de Maracaibo) de la cuenca del Río Chitagá, que más adelante toma el nombre de Río Margua y vierte sus aguas en el Arauca, tributario del Orinoco.